



PROCEEDINGS



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ

ພະເຍວາວິຈັຍ

PHAYAO RESEARCH
CONFERENCE



໒໒-໒໗ ມກຣາຄມ ໒໕໒໐

ນ ກອປະຊຸມພຸງຈຳເມືອງ ມກາວິທຍາລັຍພະເຍາ

ISBN : 978-616-7820-46-0



สารบัญ (ต่อ)

กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนำเสนอแบบ Oral Presentation (ต่อ)

SCI-057	ลิโชนาร์โดต์และดินแดงตัวดูดซับที่มีราคาถูกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สชีวภาพ โดย อาทิตย์ อัครวุฒิ นิสา เชิดในเมือง แคทลียา ไกลกลาง ดวงภา พิณกิจ คันทพจน์ ศรีสถิตย์ และ ตะวัน สุนน้อย	1482
SCI-064	ปริมาณมูลไส้เดือนดินสายพันธุ์แอฟริกันไนท์คลอเลอร์ (<i>Eudrilus eugeniae</i>) ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้า (<i>Brassica alboglabra</i>) ในสภาพโรงเรือน โดย นุชจรี ทัดเศษ และชุตินา หงษ์ศรี	1490
SCI-065	การผสมข้ามสกุลย่อยระหว่างสุปรานิ (<i>Curcuma supraneeana</i>) และว่านปด (<i>C. aurantiaca</i>) โดย ศศิธร รัตนโสภณ และ เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี	1495
SCI-067	ความหลากหลายของปลาในลำห้วยสาขาของกว๊านพะเยา โดย เสกสรรค์ อุปพงศ์ ศิริลักษณ์ วลัยญ์เพียร และ กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์	1505
SCI-068	ผลของโคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ โดย ธนภัทร วรปัสสุ พรพิมล พุยกัณ ปิยพงศ์ บางใบ ณัฐรินทร์ ศิริรัตนันท์ และ พรทิดา ทองสนทากัญจน์	1513
SCI-071	การศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติดินในพื้นที่การเกษตรเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชอินทรีย์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่ไร่เบง โดย วิมลรัตน์ ศิตสาร ทศพล สุโชติ และ สุชัย พงศ์พัฒน์ศิริ	1520
SCI-070	การบำบัดฮอโรโมน 17แอลฟา-เมทิลเทสโทสเตอโรน ในน้ำบ่อแปลงเพศปลาด้วยกระบวนการไอโซเนชั่น โดย สันติพันธ์ เฉียบแหลม ต่อพงศ์ กริธาชาติ และ เนทียา กริธาชาติ	1529
SCI-058	วิเคราะห์ทางสถิติและแนวโน้มของผลตอบรับประสบการณ์ของลูกค้าโดยใช้โปรแกรมภาษาอาร์ โดย ณาณิศา เม่นแต้ม และ วุฒิชัย รมสายหยุด	1537
SCI-059	ระบบสารสนเทศจัดการห่วงโซ่การผลิตและการส่งออกอาหารไทย กรณีศึกษา KinThai Express โดย จูติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ สุภารัตน์ อาจหาญ สุพรรณ ทองเพชร และ พัชราพรรณ ทองคำ	1550
SCI-060	การสร้างโจทย์แบบเติมคำและตรวจคำตอบโดยอัตโนมัติ โดย ภรภัทร อภิสารบุญมา และ พงษ์เทพ รักผกาวงศ์	1564
SCI-061	การสร้างโจทย์คำถามจากโจทย์ต้นแบบ เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบที่ไม่ซ้ำกัน โดย ทิพย์สุดา เพ็ชรไทย และ พงษ์เทพ รักผกาวงศ์	1572
SCI-062	ระบบควบคุมและการตอบสนองด้วยเสียงผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ โดย วรชัย ศรีสมุดคำ สมคิด ฤทธิ์เนติกุล ยศวรรณ์ จันทนา ณัฐพล ภูระหงษ์ และ พิรภัทร อิมทรัพย์	1582
SCI-063	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดพะเยา โดย พรเทพ โรจนวสุ บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิ์สันติ และ พัชราพรรณ ทองคำ	1593
SCI-069	ผลกระทบของการเพิ่มคลอโรลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีน โดย ณัฐฤดี อินทบุตร ลาวัลย์ ชันเกษตร และ ยอดชาย สิงห์ทอง	1601



ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ

Effects of chitosan on growth performance of climbing perch, *Anabas*

testudineus (Bloch, 1792)

ธนภัทร วรปัสสุ^{1*}, พรพิมล พุกกันปิยพงศ์ บางใบ¹, ณัฐรินทร์ ศิริรัตนันท์¹ และ พรทิตา ทองสนิทากัญ¹

Thanaput Worapussu^{1*}, Pornpimon Puygan¹, Piyapong Bangbai¹, NuttarinSirirustananun¹, and Porntisa Thongsanitkan¹

บทคัดย่อ

ศึกษาผลของไคโตซานต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลาหมอ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) จำนวน 3 ซ้ำ โดยเสริมไคโตซานในอาหารเม็ดสำเร็จรูปชนิดลอยน้ำ (โปรตีน 32 เปอร์เซ็นต์) ในระดับที่แตกต่างกัน ได้แก่ 0.0, 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ ทดลองเลี้ยงปลาหมอน้ำหนักเฉลี่ยเริ่มต้น 2.12 ± 0.02 กรัม ในกระชัง ขนาด $1.0 \times 2.0 \times 1.2$ เมตร ที่แขวนในบ่อดิน อัตราการปล่อย 15 ตัว/ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 120 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าปลาหมอมีน้ำหนักสุดท้ายเท่ากับ 110.20 ± 1.72 , 114.75 ± 0.77 , 118.38 ± 1.24 และ 119.41 ± 0.74 กรัม ตามลำดับ น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น มีค่าเท่ากับ 108.09 ± 1.76 , 112.63 ± 0.80 , 116.24 ± 1.30 และ 117.30 ± 0.75 กรัม ตามลำดับ อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน มีค่าเท่ากับ 0.90 ± 0.02 , 0.94 ± 0.00 , 0.97 ± 0.01 และ 0.98 ± 0.00 กรัม/วัน ตามลำดับ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ มีค่าเท่ากับ 1.86 ± 0.01 , 1.80 ± 0.01 , 1.75 ± 0.05 และ 1.76 ± 0.02 ตามลำดับ และอัตราการรอดตาย มีค่าเท่ากับ 93.33 ± 1.92 , 87.78 ± 4.00 , 90.00 ± 3.33 และ 90.00 ± 1.92 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปลาหมอที่ได้รับอาหารเสริมด้วยไคโตซานที่ระดับ 1.0 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ มีน้ำหนักสุดท้าย น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ดีกว่าปลาหมอที่ได้รับอาหารเสริมไคโตซานที่ระดับ 0.0 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) ส่วนอัตราการรอดตายพบว่าทุกชุดการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกัน ($P > 0.05$) การเสริมไคโตซานในอาหารที่ระดับ 1.0 เปอร์เซ็นต์ ช่วยให้ปลาหมอมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น

คำสำคัญ: ปลาหมอ การเจริญเติบโต ไคโตซาน

¹ สาขาการจัดการการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

¹ Department of Agricultural Management, Faculty of Agricultural and Industrial Technology, Phetcabun Rajabhat University, Phetcabun 67000

*Corresponding author e-mail: Thanaput_07@hotmail.com

Abstract

The aim of this study to determine the effect of chitosan on growth performances of climbing perch, *Anabas testudineus* (Bloch, 1792). The experimental design was Completely Randomized Design (CRD) at 3 replications. Mixed feed contained different concentration of chitosan as 0.0, 0.5, 1.0 and 1.5 percent of floating pellet feed (32 percent protein). Fish with the initial average weight 2.12 ± 0.02 g. They were fed for 120 days to climbing perch fingerling stocked in net cage hapa. (1.0 x 2.0 x 1.2 m) placed in earthen pond at a density of 15 fish/m². Results indicated that final weight were 110.20 ± 1.72 , 114.75 ± 0.77 , 118.38 ± 1.24 and 119.41 ± 0.74 g respectively, weight gained was 108.09 ± 1.76 , 112.63 ± 0.80 , 116.24 ± 1.30 and 117.30 ± 0.75 g respectively, average daily growth was 0.90 ± 0.02 , 0.94 ± 0.00 , 0.97 ± 0.01 and 0.98 ± 0.00 g/day respectively, feed conversion ratio was 1.86 ± 0.01 , 1.80 ± 0.01 , 1.75 ± 0.05 and 1.76 ± 0.02 respectively, survival rate was 93.33 ± 1.92 , 87.78 ± 4.00 , 90.00 ± 3.33 and 90.00 ± 1.92 percent respectively. From the study the result showed that fish were fed with diets of chitosan as 1.0 and 1.5 percent of feed had greater in final weight, weight gain, average diary growth, feed conversion rate than those fed with control diet ($P < 0.05$). No significant difference was found in survival rates ($P > 0.05$). In summary, 1.0 percent chitosan should be added in climbing perch diet to provide better growth.

Keywords: climbing perch, growth performances, chitosan

บทนำ

ไคโตซานเป็นอนุพันธ์ของไคติน ซึ่งเป็นโพลีแซคคาไรด์ที่พบมากในธรรมชาติเป็นอันดับสองรองจากเซลลูโลส (Knorr, 1984) ไคตินและไคโตซานพบได้ทั่วไปทั้งในพืชและสัตว์ ได้แก่ กุ้ง หอย แมลง รา และยีสต์ ปริมาณไคตินที่พบจะแตกต่างกันไปตามชนิดของสิ่งมีชีวิต ไคโตซานที่ได้จากการกำจัดหมู่ อะซิติลของไคตินด้วยด่างเข้มข้นทำให้โครงสร้างทางเคมีของ ไคตินเปลี่ยนแปลงโดยหมู่อะซิติลของไคตินถูกแทนที่ด้วยอะตอมของไฮโดรเจนกลายเป็นหมู่อะมิโน ($-NH_2$) ที่คาร์บอนตำแหน่งที่สอง ดังนั้นไคโตซาน คือ D-glucosamine(2-amino-2-deoxy-D-glucose) หรือ Poly- $\beta(1,4)$ -2-amino-2-deoxy-D-glucose มีสูตรทั่วไปเป็น $(C_6H_{11}NO_4)$ (ลีลา เรืองแป้น, 2542; ภาวดี เมธะคามนธ์ และคณะ, 2543) โดยทั่วไปถ้าหมู่อะซิติลถูกตัดออกไปประมาณร้อยละ 60 ไคตินจะถูกเรียกว่าไคโตซาน และถ้าหมู่อะซิติลถูกตัดหรือหลุดออกไปประมาณร้อยละ 90-100 จะเรียกว่า fully deacetylated chitosan ความสามารถในการกำจัดหมู่อะซิติลจะขึ้นอยู่กับแหล่งของไคตินและกระบวนการผลิต (ขวัญใจ, 2541) ไคโตซานได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร ด้านอาหารและเครื่องสำอาง (อัยยา กังสุวรรณ, 2541) การใช้ไคโตซานในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั้น ช่วยทำให้การเจริญเติบโตและระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้น สาลิกา กัลปพฤกษ์และคณะ (2556) กล่าวว่า การผสมไคโตซานในอาหารสัตว์น้ำจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ มีงานทดลองที่ประสบผลสำเร็จในการใช้ไคโตซานเพื่อเร่งการเจริญเติบโต และกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน อาทิเช่น ปลาไน (Gopalakannan and Arul, 2006) ปลาช่อนทะเล (Geng et al., 2011) ปลา kelp grouper (*Epinephelus bruneus*) (Harikrishnan et al., 2012) ปลา koi (*Cyprinus carpio koi*) (Lin et al., 2012) ปลานิล (มนต์ สรวง ยางทอง และคณะ, 2550) จากข้อดีของไคโตซานที่มีผลต่อการเร่งการเจริญเติบโต และกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำ ทั้งนี้ยังเป็นการช่วยลดปัญหาและสารเคมีที่ตกค้างในสัตว์น้ำ จากการใช้อยาและสารเคมีในการรักษาโรค



อันจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ไคโตซานจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งของการใช้สารกระตุ้นทางธรรมชาติ การนำไคโตซานมาใช้ในการเพาะเลี้ยงปลาหมอบเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยอาจบลาหมอบมีการเจริญเติบโตดีขึ้น

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา

การวางแผนการทดลอง

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized design : CRD) โดยปล่อยลูกปลาลงเลี้ยงในกระชัง ด้วยอัตราความหนาแน่น 15 ตัว/ตารางเมตร ใช้กระชังในการทดลองทั้งหมด 12 กระชัง แบ่งออกเป็น 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ำ ระยะเวลาทดลอง 120 วัน โดยใช้อาหารผสมไคโตซาน ในระดับที่แตกต่าง ๆ กัน 4 ระดับ (ระดับละ 3 ซ้ำ) ดังนี้

ระดับที่ 1 ผสมไคโตซาน 0.0 เปอร์เซ็นต์ (ชุดควบคุม)

ระดับที่ 2 ผสมไคโตซาน 0.5 เปอร์เซ็นต์

ระดับที่ 3 ผสมไคโตซาน 1.0 เปอร์เซ็นต์

ระดับที่ 4 ผสมไคโตซาน 1.5 เปอร์เซ็นต์

การเตรียมสัตว์ทดลอง

คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีความสมบูรณ์เพศ นำมาเพาะด้วยการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์กระตุ้นความสมบูรณ์เพศ ซึ่งใช้ฮอร์โมน busserelin ร่วมกับ domperidone โดยปลาเพศเมียฉีดฮอร์โมน busserelin 15 ไมโครกรัมต่อน้ำหนักปลา 1 กิโลกรัม ร่วมกับ domperidone 5 มิลลิกรัมต่อปลา 1 กิโลกรัม และเพศผู้ฉีดฮอร์โมน busserelin 5 ไมโครกรัมต่อน้ำหนักปลา 1 กิโลกรัม ร่วมกับ domperidone 5 มิลลิกรัมต่อปลา 1 กิโลกรัม ทั้งเพศเมียและเพศผู้ฉีดฮอร์โมนกระตุ้นเพียงครั้งเดียว แล้วปล่อยให้ผสมพันธุ์กันเองในกระชังโอสถอนแก้ว อัตราส่วนในการเพาะพันธุ์ เพศเมีย/เพศผู้ เท่ากับ 1 ต่อ 2 ตัว หลังจากที่ได้พ่อแม่พันธุ์วางไข่เรียบร้อยแล้ว ย้ายพ่อแม่พันธุ์ออกจากกระชัง จากนั้นย้ายไข่ไปฟักในบ่อซีเมนต์ และอนุบาลเป็นระยะเวลา 1 เดือน จากนั้นสุ่มซึ่งน้ำหนักลูกปลาลงกระชังทดลอง ที่อัตราความหนาแน่น 15 ตัวต่อตารางเมตร ชุดการทดลองละ 3 ซ้ำ

การเตรียมอาหารทดลอง

ซึ่งไคโตซานตามอัตราส่วนที่กำหนด คือ 0, 5, 10 และ 20 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม โดยผสมไคโตซานกับสารเคลือบ (∞ -Starch) ประมาณ 20 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม (ทุกชุดการทดลอง) นำส่วนผสมไคโตซานและสารเคลือบไปคลุกเคล้ากับอาหารเม็ดสำเร็จรูปชนิดลอยน้ำ (โปรตีน 32 เปอร์เซ็นต์) แล้วฉีดด้วยน้ำกลั่นเพื่อให้ไคโตซานและสารเคลือบยึดเกาะกับเม็ดอาหาร และนำอาหารทดลองผึ่งไว้ในที่ร่มจนอาหารแห้ง บรรจุอาหารทดลองในถุงพลาสติกแล้วเก็บรักษาไว้ในตู้เย็น

การให้อาหารทดลอง

ให้อาหารวันละ 2 ครั้งในอัตรา 7 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวต่อวันในเดือนที่ 1 และในอัตรา 5 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวต่อวันในเดือนที่ 2-4 ของการทดลอง ที่ช่วงเวลา 09:00-10:00 น. และ 15:00-16:00 น. ปรับปริมาณอาหารที่ให้ตามน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นทุก 15 วัน ตลอดช่วงระยะเวลาของการทดลอง 120 วัน

การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำในกระชังทดลองเมื่อเริ่มต้นและทุก 14 วันจนเสร็จสิ้นการทดลองได้แก่อุณหภูมิและ pH ด้วย waterproof EZODO 6011 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำด้วยวิธี Azide Modification แอมโมเนีย-ไนโตรเจน วิเคราะห์หาค่าด้วย Colorimetric method



การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
นับจำนวนและชั่งน้ำหนักปลาหม่อเริ่มต้น ระหว่างการทดลอง และสิ้นสุดการทดลองในแต่ละชุดการทดลอง นำ
ข้อมูลที่ได้ไปคำนวณหาค่าต่าง ๆ ดังนี้

ก. อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (Average diary growth : ADG) (กรัม/วัน)

$$ADG = \frac{(\text{น้ำหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง} - \text{น้ำหนักปลาเมื่อเริ่มการทดลอง})}{\text{จำนวนวันที่ทดลอง}}$$

ข. อัตรารอด (Survival) เปอร์เซ็นต์

$$= (\text{จำนวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง} / \text{จำนวนปลาเมื่อเริ่มการทดลอง}) \times 100$$

ค. น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (Weight gain : WG) (กรัม)

$$WG = \text{น้ำหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง} - \text{น้ำหนักปลาเมื่อเริ่มการทดลอง}$$

ง. อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (Feed conversion ratio : FCR)

$$FCR = \frac{\text{น้ำหนักของอาหารที่ปลากิน}}{\text{น้ำหนักปลาที่เพิ่มขึ้น}}$$

นำข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อศึกษาความแตกต่างของแต่ละชุด
การทดลอง จากนั้นเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละชุดการทดลองโดยวิธีของ Tukey's test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95
เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS

ผลการศึกษา

หลังสิ้นสุดการทดลองการเลี้ยงปลาหม่อด้วยอาหารเสริมด้วยโคโคซานที่ระดับแตกต่างกัน เป็นระยะเวลา 120
วัน พบว่า ปลาหม่อที่ได้รับอาหารเสริมด้วยโคโคซานที่ระดับ 1.0 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ มีน้ำหนักสุดท้าย น้ำหนักที่
เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับปลาหม่อที่ได้รับอาหารเสริม
ด้วยโคโคซานที่ระดับ 0.0 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อพบว่าปลาหม่อที่ได้รับอาหารเสริมด้วยโคโคซาน
ที่ระดับ 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับ
ปลาหม่อที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมด้วยโคโคซานที่ระดับ 0.0 เปอร์เซ็นต์ และในส่วนของการรอดตายพบว่าทุกชุด
การทดลองมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 1 ส่วนคุณภาพน้ำพบว่าคุณภาพน้ำในกระชัง
ปลาหม่อที่ได้อาหารเสริมด้วยโคโคซาน ทั้ง 4 ชุดการทดลอง (0.0, 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์) มีความเป็นกรด เป็น
ด่าง ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของปลาหมอที่เลี้ยงในกระชัง ด้วยอาหารเสริมด้วยไคโตซาน ในระดับที่แตกต่างกัน เป็นระยะเวลา 120 วัน

พารามิเตอร์	ระดับของไคโตซาน (เปอร์เซ็นต์)				P-value
	0.0	0.5	1.0	1.5	
น้ำหนักเริ่มต้น (กรัมต่อตัว)	2.11±0.04	2.11±0.04	2.13±0.06	2.11±0.04	0.987
น้ำหนักสุดท้าย (กรัมต่อตัว)	110.20±1.72 ^a	114.75±0.77 ^{ab}	118.38±1.24 ^b	119.41±0.74 ^b	0.003
น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัมต่อตัว)	108.09±1.76 ^a	112.63±0.80 ^{ab}	116.24±1.30 ^b	117.30±0.75 ^b	0.004
อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (กรัมต่อวัน)	0.90±0.02 ^a	0.94±0.00 ^{ab}	0.97±0.01 ^b	0.98±0.00 ^b	0.005
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ	1.86±0.01 ^b	1.80±0.01 ^a	1.75±0.05 ^a	1.76±0.02 ^a	0.002
อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์)	93.33±1.92	87.78±4.00	90.00±3.33	90.00±1.92	0.594

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ± SE ตามด้วยตัวอักษรที่ต่างกันในแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 2 คุณภาพน้ำเฉลี่ยในกระชังที่เลี้ยงปลาหมอด้วยอาหารเสริมด้วยไคโตซาน ในระดับที่แตกต่างกัน เป็นระยะเวลา 120 วัน

พารามิเตอร์	ระดับของไคโตซาน (เปอร์เซ็นต์)				P-value
	0.0	0.5	1.0	1.5	
ความเป็นกรด เป็นด่าง	7.23±0.03 ^a	7.20±0.00 ^a	7.20±0.00 ^a	7.20±0.00 ^a	0.441
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	28.83±0.07 ^a	28.63±0.12 ^a	28.73±0.67 ^a	28.77±0.03 ^a	0.391
ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (มิลลิกรัม/ลิตร)	3.03±0.03 ^a	2.90±0.06 ^a	3.00±0.06 ^a	2.93±0.03 ^a	0.250
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (มิลลิกรัม/ลิตร)	0.032±0.001 ^a	0.033±0.001 ^a	0.032±0.001 ^a	0.032±0.001 ^a	0.840

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ± SE ตามด้วยตัวอักษรที่ต่างกันในแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

วิจารณ์และสรุปผล

หลังสิ้นสุดการทดลองเลี้ยงปลาหมอในกระชัง ด้วยอาหารเสริมด้วยไคโตซาน ในระดับที่แตกต่างกัน คือ 0.0, 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 120 วัน พบว่าปลาหมอที่ได้รับอาหารเสริมด้วยไคโตซานที่ระดับ 1.0 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ มีน้ำหนักสุดท้าย น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ดีกว่าปลาหมอที่ได้รับอาหารเสริมด้วยไคโตซาน 0.0 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับการทดลองของ มนต์สรวง ยางทอง และคณะ (2550) ที่พบว่าการเคลือบด้วยไคโตซานในระดับ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร เป็นระดับที่ทำให้ปลานิลมีน้ำหนักเฉลี่ยต่อตัว น้ำหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน สูงที่สุด และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ต่ำที่สุด Geng et al. (2011) พบว่าการเสริมไคโตซานในอาหารที่ระดับ 3 และ 6 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ส่งผลให้ปลาช่อนทะเล มีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่ากลุ่มที่ได้รับอาหารควบคุม กัญช เกล็ดมณี และคณะ (2553) พบว่าการเสริมไคโตซานเข้มข้น 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักอาหาร ทำให้ปลากะพงขาวมีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น สาลิกาและคณะ (2556) กล่าวว่า การผสมไคโตซานในอาหารสัตว์น้ำจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่ง



การเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ แต่ขัดแย้งกับการทดลองของ ดวงมล แสนสวาท (2552) พบว่าการเสริมไคโตซานในอาหารปลาชนิด ที่ระดับ 2.5, 5.0, 7.5 และ 10.0 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีการเจริญเติบโตต่ำกว่ากลุ่มควบคุม และ Shiau and Yu (1999) การเสริมไคโตซานในระดับที่สูงเกินไปในอาหารจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปลา การทดลองครั้งจึงสรุปผลได้ว่าการเสริมไคโตซานในอาหาร ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลาหมอบ

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เอกสารอ้างอิง

- กัญช์ เกียรติมณี ปภาศิริ, กาญจน์ภาศ-บาร์เนท คเชนทร, เฉลิมวัฒน์ วิชชุตา ประสาทแก้ว, สุกันดา ทับเมฆา และหยาดเพชร โอเจริญ. (2553). การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของปลากะพงขาว (*Lates calcarifer* Bloch) ต่อการเสริมอาหารด้วยไคโตซาน. เอกสารการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, (หน้า 55–63). สาขาประมง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.
- ขวัญใจ สุชินพงศ์พันธ์. (2541). การนำไคโตแซนไปใช้ประโยชน์ทางด้านภาชนะบรรจุ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 120 หน้า.
- ดวงมล แสนสวาท. (2552). ผลของไคโตซานต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในปลานิล. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 59 หน้า.
- ภาวดี เมธะคานนท์, อศิรา เฟื่องฟู และ ก้องเกียรติ คงสุวรรณ. (2543). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ไคติน – ไคโตซาน. MTEC เทคโนโลยีวัสดุ. 19: 69–75.
- มนต์สรวง ยางทอง, แววลี วิบูลย์กิจ และ พิมาน เถาสมบัติ. (2550). ศึกษาการเจริญเติบโตของปลา นิลแปลงเพศที่ได้รับอาหารเคลือบไคโตซานระดับต่าง ๆ. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 1(2): 223 – 234.
- ลีลา เรืองแบน. (2542). ไคโตซาน. สัตว์น้ำ. 12(142): หน้า. 65–68.
- สาธิตา กัลปพฤกษ์, ผกายวรรณ กีก้อง และ สิทธิ กุหลาบทอง. (2556). ไคโตซานในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal 6(2): หน้า. 984–993
- อัยยา กังสุวรรณ. (2541). ไคตินผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับศตวรรษที่ 21. วารสารกรมประมง 51(1): 57–67.
- Geng X, Dong XH, Tan BP, Yang QH, Chi SY, Liu HY. and Li XQ. (2011). Effects of dietary chitosan and *Bacillus subtilis* on the growth performance, non-specific immunity and disease resistance of cobia, *Rachycentron canadum*. Fish & Shellfish Immunology 31: 400–406.
- Gopalakannan A. and Arul V. (2006). Immunomodulatory effects of dietary intake of chitin, chitosan and levamisole on the immune system of *Cyprinus carpio* and control of *Aeromonas hydrophila* infection in ponds. Aquaculture 255: 179–187.
- Harikrishnan R, Kim JS, Balasundaram C. and Heo MS. (2012). Immunomodulatory effects of chitin and chitosan enriched diets in *Epinephelus bruneus* against *Vibrio alginolyticus* infection. Aquaculture 326–329: 46–52.



- Knorr D. (1984). Use of chitinous polymer. Food Technology. 38: 85–97.
- Lin S, Mao S, Guan Y, Luo L, Luo L. and Pan Y. (2012). Effects of dietary chitosan oligosaccharides and *Bacillus coagulans* on the growth, innate immunity and resistance of koi (*Cyprinus carpio koi*). Aquaculture 342–343: 36–41.
- Shiau SY. and Yu YP. (1999). Dietary supplementation of chitin and chitosan depresses growth in Tilapia, *Oreochromis niloticus* × *O. auratus*. Aquaculture 179: 439–446.



รายชื่อบรรณาธิการพิจารณาบทความตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) พะเยาวิจัยครั้งที่ 6

1	ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทนต์	29	รองศาสตราจารย์ ดร.ลาลี ทองธิว
2	ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ์ อัครเอกมอลิน	30	รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ
3	ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดกุล	31	รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สังข์อ่อง
4	ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ	32	รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นธการกิจกุล
5	ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา จตุรลิตา	33	รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ประศาสน์วุฒิ
6	ศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง	34	รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์
7	ศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง	35	รองศาสตราจารย์ ธรกร ช้างน้อย
8	ศาสตราจารย์ ดร.อิสระชัย งามหุ	36	รองศาสตราจารย์ ปราโมทย์ ประเสริฐ
9	ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทรดียิ่ง	37	รองศาสตราจารย์ เปรมวิทย์ วิวัฒน์เศรษฐ์
10	รองศาสตราจารย์ ดร.กวิณ สอนิเพิ่มพูน	38	รองศาสตราจารย์ อมรา โกไศยกานนท์
11	รองศาสตราจารย์ ดร.จงกลดินทร์ แสงอาสภวิริยะ	39	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรทอง ทองจตุ
12	รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร บุญญาภาพ	40	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์
13	รองศาสตราจารย์ ดร.เจตหล้า สุนทรวิภาต	41	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงลักษณ์ พาหะชา
14	รองศาสตราจารย์ ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย	42	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา ประดิษฐ์สุภาพร
15	รองศาสตราจารย์ ดร.โชค โสรัจกุล	43	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ไชยกุลวัฒนา
16	รองศาสตราจารย์ ดร.ทงศักดิ์ คุ่มไชนะ	44	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุติรัตน์ เขียวสุวรรณ
17	รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย	45	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร จักรวัฒนา
18	รองศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพย์วงศ์	46	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะภาพ
19	รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ อธิอำพน	47	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ แย้มบางหวาย
20	รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ สายแสง	48	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์
21	รองศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ เพ็ชรมนกุล	49	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กริธาชาติ
22	รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ทิตยวรรณ	50	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ชมพุดัน
23	รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา	51	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว
24	รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกีจวร	52	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิ บุณจันทร
25	รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย	53	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันทรแดง
26	รองศาสตราจารย์ ดร.สมบุญ อนันตลาโภชัย	54	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก
27	รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ภูวิภาตวรธน	55	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน
28	รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์	56	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประลาลี โอภาสนันท์



รายชื่อบรรณาธิการพิจารณาบทความตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) พะเยาวิจัยครั้งที่ 6

- | | |
|---|------------------------------------|
| 57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาบรรณ | 87 นาวาอากาศตรี ดร.สหัสชัย มหาวีระ |
| 58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศกดิ์ ชินชัย | 88 ดร. ก.วริฐ ระวังเหตุ |
| 59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรชัย คำวงษ์ | 89 ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย |
| 60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ | 90 ดร.ขวัญสิริณา ธนะวงศ์ |
| 61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลีมาศ สิทธิสมบัติ | 91 ดร.คุณากร ชัดศรี |
| 62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพธนา หมั่นดี | 92 ดร.จักรพงษ์ จำรูญ |
| 63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ชัยเจริญศรี | 93 ดร.จินตนา ยาโนละ |
| 64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ | 94 ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย |
| 65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชร แลน้อย | 95 ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ |
| 66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชร วงศ์ปัญญา | 96 ดร.คารินทร อินทัททิม |
| 67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทีตา ผจญภัย | 97 ดร.ดาวยศ ดาวเรือง |
| 68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา พิทักษ์พล | 98 ดร.ดำรงค์ อมรเดชาพล |
| 69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ อมรากุล | 99 ดร.ตฤณ เสรมะรากุล |
| 70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหัว | 100 ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ |
| 71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บุรณะชาติ | 101 ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง |
| 72 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติวัฒน์ พิทักษ์พล | 102 ดร.ธิดา ไชยวงศ์ศรี |
| 73 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ จินประชา | 103 ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว |
| 74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี เจียมพานิชกุล | 104 ดร.นพรัตน์ เกตุขาว |
| 75 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเดช วชิราศรีศิริกุล | 105 ดร.นันทธีธนนท์ พงษ์พานิช |
| 76 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล | 106 ดร.นันทิมา นาคาพงศ์ |
| 77 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มัทธพนพรค | 107 ดร.นิคม นาคสุพรรณ |
| 78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ | 108 ดร.เนติ เงินแพทย์ |
| 79 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร | 109 ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันต์ |
| 80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลยา โกไศยกานนท์ | 110 ดร.บังอร สวัสดิ์สุข |
| 81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ | 111 ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง |
| 82 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะพงษ์ สุวรรณมณีโชติ | 112 ดร.บุญฤทธิ์ สิ้นค้างาม |
| 83 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ขำพึงสน | 113 ดร.ปรเมศร์ ปธิเก |
| 84 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย โสมดี | 114 ดร.ปาลินี สุมิตสวรรค์ |
| 85 พลตำรวจเอกศุภวุฒิ สังข์อ่อง | 115 ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว |
| 86 พลอากาศเอกทองเลื่อน ประพัฒน์ทอง | 116 ดร.ฝนทิพย์ จินนุทยา |



รายชื่อบรรณาธิการพิจารณาบทความตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) พะเยาวิจัยครั้งที่ 6

- | | | | |
|-----|--------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 117 | ดร.พนิตนาฏ ฐุ่พุดินันท์ | 139 | ดร.สุธรรม อรุณ |
| 118 | ดร.พญักดิ์กดี ดันติไพบูลย์วงศ์ | 140 | ดร.สุธี วังเดือย |
| 119 | ดร.พรเทพ ไรจนวสุ | 141 | ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ |
| 120 | ดร.พัชรพิตดา ศรีสมพงษ์ | 142 | ดร.สุนมา เหลืองฐิติกาญจนา |
| 121 | ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส | 143 | ดร.สุรพล ดำรงกิตติกุล |
| 122 | ดร.รณกร สร้อยนาค | 144 | ดร.สุริยา สัมจันทร์ |
| 123 | ดร.วรัญญา ยิ่งยงค์กดี | 145 | ดร.สุรียพร แสงวงศ์ |
| 124 | ดร.वलันต์ คำสนาม | 146 | ดร.แสงเดือน พงศ์แก้วงาม |
| 125 | ดร.วราชต์ มัธยมบุรุษ | 147 | ดร.อัษฎรากร คำมาสุข |
| 126 | ดร.วิชัยพล พักแก้ว | 148 | ดร.อัษฎราวุธ แก้ววรรณดี |
| 127 | ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ | 149 | แพทย์หญิงณัฐินี นันทาทอง |
| 128 | ดร.วิพนมณภัทร พุทธวโรตม์ผล | 150 | นักกายภาพบำบัด วีระศักดิ์ ติยะปัญญา |
| 129 | ดร.วีระพงษ์ กิตติวงศ์ | 151 | นางสาวปิยะวรรณ เอมอิมอนันต์ |
| 130 | ดร.ศกยภาพ ประเวทจิตร | 152 | นางสาวศิริลักษณ์ วลัยชัยเพียร |
| 131 | ดร.ศิริลักษณ์ วัญชัยเพียร | 153 | นายเกษม สมทะนะ |
| 132 | ดร.ศุภวัชร สิงห์ทอง | 154 | นายณรงค์ นวลเมือง |
| 133 | ดร.สาคร เมฆรักขาวนิช | 155 | นายนคร คำร้อง |
| 134 | ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน | 156 | นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ |
| 135 | ดร.สาวิตรี นงอလာ | 157 | นายพุทธิพงษ์ พลคำฮัก |
| 136 | ดร.สิงห์คำ ธิมา | 158 | นายศราวุธ จันทระ |
| 137 | ดร.สุขชาติรี ประสมสุข | 159 | นายสิทธิพล วิชาลาภรณ์ |
| 138 | ดร.สุทธินันท์ ศรีรัตนวงศ์ | 160 | ว่าที่ร้อยตรี ดร.รังสรรค์ เกตุฮึด |